DISETUJUI OLEH BPOM : 03/10/2024
ID : ERE G100273124000 71
ERE G100273124000 73

Panadol Anak-anak Paracetamol

Tablet kunyah rasa cherry

LPOM-00140087580218

2-12 TAHUN

Meredakan:
Demam ✓
Nyeri ✓

1 blister @10 tablet kunyah

HALEON

KOMPOSISI:
Setiap tablet kunyah mengandung Paracetamol 120 mg.
CARA KERJA OBAT:
Sebagai analgesik dan antipiretik.

INDIKASI:
Untuk meredakan rasa sakit, seperti: sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam yang menyertai flu dan demam sesudah vaksinasi.

KONTRAINDIKASI:
Penderita yang hipersensitif terhadap paracetamol dan bahan lainnya dalam obat ini. Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat.

DOSIS:

Umur	Dosis
Di bawah 2 tahun	gunakan Panadol Anak-anak Drops 0-1 tahun.
2 - 5 tahun	1 - 2 tablet.
6 - 12 tahun	2 - 4 tablet.

Panadol Anak-anak Tablet Kunyah 2-12 tahun tidak dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun.

ATURAN PAKAI:
3 - 4 kali sehari. Dapat dikunyah langsung, dihancurkan, atau dicampur dengan air/jus buah. Minimum interval penggunaan dosis adalah 4 jam dan tidak melebihi 4 kali dalam 24 jam. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan atau menurut aturan dokter.

EFEK SAMPING:
Penggunaan jangka panjang dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Efek samping yang lain yaitu reaksi hipersensitivitas; seperti: kemerahan atau gatal pada kulit; kulit terkelupas; kadang-kadang gangguan pernapasan (termasuk gangguan pernapasan yang disebabkan oleh aspirin dan NSAID) atau bengkak pada bibir, lidah, tenggorokan, wajah; sariawan; memar-memar; pendarahan. Namun, reaksi efek samping jarang terjadi. Hentikan penggunaan obat dan segera hubungi dokter jika mengalami efek samping.

PERINGATAN DAN PERHATIAN :
- Bila rasa sakit bertahan lebih dari 3 hari, dan demam tidak menurun selama 2 hari, atau bila ada kemerahan pada kulit, segera berkonsultasi dengan dokter.
- Hati-hati pemberian obat ini pada penderita penyakit ginjal.
- Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati.
- Tidak dianjurkan penggunaan secara bersamaan dengan obat lain yang mengandung paracetamol.
- Hubungi dokter sebelum menggunakan obat ini bersamaan dengan warfarin atau obat antikoagulan lainnya.
- Jika anda mengidap infeksi akut, dapat meningkatkan resiko terjadinya metabolik asidosis.
- Gejala-gejala metabolik asidosis dapat berupa : Pernapasan yang cepat dan dalam, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Segera hubungi dokter jika anda mengalami salah satu dari gejala tersebut.
- Segera hubungi dokter jika menggunakan obat melebihi dosis yang dianjurkan.

KEMASAN: Dus, 10 amplop @ 1 blister @ 10 tablet kunyah.
No. Reg. DBL012450196 3B1.

SIMPAN DALAM WADAH TERTUTUP RAPAT DAN DI BAWAH 30°C. JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.

Diproduksi oleh:
PT Sterling Products Indonesia
Jakarta, Indonesia

BPOM RI

Trade Marks are owned by or licensed to the Haleon group of companies.
©2023 Haleon group of companies or its licensor.

8 992695 160201

HET, No. Bets, Tanggal Produksi, dan Batas Kedaluwarsa lihat di blister

62000000206051 0923

62000000206051 0923